

I RAPACI E IL CONERO

Griliste

Albonella minore

Falco pescatore

ELENCO DELLE SPECIE DI UCCELLI RAPACI OSSERVATI AL CONERO

Nome italiano	Nome scientifico	Fenologia	Nome italiano	Nome scientifico	Fenologia
ALBANELLA MINORE	<i>Circus pygargus</i>	migratore	GHEPPO	<i>Falco tinnuculus</i>	stanziale-ridicoltante-migratore
ALBANELLA PALLIDA	<i>Circus macrourus</i>	migratore	GRILIAO	<i>Falco naumanni</i>	migratore
ALBANELLA REALE	<i>Circus cyaneus</i>	migratore	LANARIO	<i>Falco biarmicus</i>	ridicoltante-irregolare
AQUILA ANTRHIA MAGG.	<i>Aquila clanga</i>	migratore irregolare	LOODOLAIO	<i>Falco subtilis</i>	migratore-ridicoltante
AQUILA ANTRHIA MIN.	<i>Aquila pomarina</i>	migratore irregolare	NIBBO BRUNO	<i>Elanus caeruleus</i>	migratore-accidentale
AQUILA DELLE STEPPES	<i>Aquila nipalensis</i>	migratore accidentale	NIBBO BRUNO	<i>Mimus migrans</i>	migratore
AQUILA IMPERIALE	<i>Aquila heliaca</i>	migratore accidentale	NIBBO REALE	<i>Mimus minutus</i>	migratore
AQUILA MINORE	<i>Aquila pennata</i>	migratore irregolare	PELLEGRINO	<i>Falco peregrinus</i>	stanziale-ridicoltante
AQUILA REALE	<i>Aquila chrysaetos</i>	accidentale	PELLEGRINO <i>ssp calidus</i>	<i>Falco peregrinus</i>	migratore irregolare
ASTORE	<i>Accipiter gentilis</i>	migratore accidentale	POIANA	<i>Buteo buteo</i>	stanziale-ridicoltante-migratore
BIANCONE	<i>Circus gallicus</i>	migratore-estivante irregolare	POIANA CALZATA	<i>Buteo lagopus</i>	migratore irregolare
CAPOVACCAIO	<i>Neophron percnopterus</i>	migratore irregolare	POIANA CODABIANCA	<i>Buteo rufinus</i>	migratore irregolare
FALCO CUCULO	<i>Falco vespertinus</i>	migratore	PORANA DELLE STEPPES	<i>Butastur vulpinus</i>	migratore irregolare
FALCO DELLA REGINA	<i>Falco eleonorae</i>	migratore	SACRO	<i>Falco cherrug</i>	migratore irregolare
FALCO DI PALICE	<i>Circus engelhardti</i>	migratore	SMERIGLIO	<i>Falco columbarius</i>	migratore irregolare
FALCO PECHIAIAOLO	<i>Peris apivorus</i>	migratore-ridicoltante	SPARVIERE	<i>Accipiter nisus</i>	stanziale-ridicoltante-migratore
FALCO PESCATORE	<i>Pandion haliaetus</i>	migratore	SPARVIERE LEVANTINO	<i>Accipiter brevipes</i>	migratore accidentale

Le principali rotte migratorie primaverili

Albonella pallida

Ciconia nigra

Le specie rare osservate finora al Conero sono state l'Aquila imperiale, il Nibbio bianco, anche se quest'ultimo attualmente annata di massiccia presenza ad altre molto scarse.

La distanza tra le due stazioni è di circa 120 km che i rapaci superano in poco più di 3h di volo

Il Falco pechialao è la prima specie per numero di individui di passo migratorio al Conero. In ogni stagione si contano circa 6.000 uccelli di questa specie, mentre il numero totale dei rapaci in transito si attesta attorno alle 11.000 unità. Da pochi anni alcune coppie di questo splendido rapace si fermano a nidificare nei boschi del monte Conero, involvendo ogni estate dai cinque ai sette giovani.

Il Falco di palude, della famiglia dei Circus, è la seconda specie per totale annuale di presenze (circa 3.000 uccelli), ed è l'unico rapace a essere sempre osservabile dall'inizio alla fine del periodo migratorio (da metà marzo ai primi di giugno).

Il Falco pechialao

Il Falco di palude

La GRADINA del Poggio

M. dei Cervi, Pian Grande, M. Colombo

Belvedere nord, Piani di Raggetti

Le specie rare osservate finora al Conero sono state l'Aquila imperiale, il Nibbio bianco, anche se quest'ultimo attualmente annata di massiccia presenza ad altre molto scarse.

I luoghi più interessanti per l'osservazione della migrazione dei rapaci nel territorio del Parco sono (in ordine di importanza):

- La GRADINA del Poggio
- M. dei Cervi, Pian Grande, M. Colombo
- Belvedere nord, Piani di Raggetti

I RAPACI CHE NIDIFICANO SULLE FALESIE E NEI BOSCHI DEL CONERO

Edizione, contributi grafici e realizzazione Marco Borioni ©2010